




**Rappel :** L'ozone se forme par transformation, sous l'action du soleil et de la chaleur, de certains polluants émis essentiellement par le transport routier et les industries. Les concentrations d'ozone les plus élevées sont donc observées lors de la période estivale (1<sup>er</sup> avril au 30 septembre).

L'indice OZONE de la zone « Ouest Aude » est calculé depuis le 1<sup>er</sup> avril 2011.

## 1/ FREQUENCE D'APPARITION DE L'INDICE OZONE (1/04 au 30/09)



Indice OZONE	en % du nombre de jours pendant la <b>période estivale</b> (1 <sup>er</sup> avril au 30 septembre)		
	2011	2012	2013
Très Bon à Bon (indices 1 à 4)	50%	67%	72%
Moyen à Médiocre (indices 5 à 7)	50%	33%	28%
Mauvais à Très Mauvais (indices 8 à 10)	0%	0%	0%

**Les indices « TRES BON A BON » sont nettement majoritaires**

## 2/ COMMENTAIRES SUR LA PERIODE ESTIVALE 2013

Lors la période estivale 2013,

- la fréquence d'apparition des indices « TRES BON A BON » est en nette augmentation par rapport aux étés précédents (+ 22% depuis 2011) en lien avec la diminution des concentrations d'ozone sur cette zone (*pour plus de détails, se reporter au rapport « ozone été 2013 – Ouest de l'Aude – Bilan des mesures permanentes » disponible sur le site internet d'AIR LR : [www.air-lr.org](http://www.air-lr.org)*).
- en contrepartie, les indices « MOYEN A MEDIOCRE » ont été moins fréquents.

**Remarque : hors période estivale** (c'est-à-dire du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mars, puis du 1<sup>er</sup> octobre au 31 décembre), les conditions météorologiques sont peu favorables à la formation de l'ozone. L'indice OZONE est donc très majoritairement « TRES BON A BON ».

#### Echelle Indice OZONE :

1 = Très bon ; 2 = Très bon ; 3 = Bon ; 4 = Bon ; 5 = Moyen ;  
6 = Médiocre ; 7 = Médiocre ; 8 = Mauvais ; 9 = Mauvais ; 10 = Très Mauvais