


surveiller, prévoir, informer pour agir sur la qualité de l'air en Occitanie

### Évaluation de la qualité de l'air en 2022 sur le territoire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées




### L'air que l'on respire

### Situation réglementaire



### Évolution pluriannuelle - PM<sub>10</sub>





### Évolution pluriannuelle - NO<sub>2</sub>



### **Exposition chronique de la population\*\***

| Les évaluations de la population exposée recourent à des estimations sur l'activité humaine. |                   |                 |                        |  |  |
|--|-------------------|-----------------|------------------------|--|--|
| $PM_{10}$  | PM <sub>2.5</sub> | NO <sub>2</sub> | 0 <sub>3</sub> (Haute- |  |  |
| Opersonne  | 1250 personnes    | <b>ů</b> 0      | 229600 personnes       |  |  |
| o<br>personne  | 0<br>personne     | personne        | 0<br>personne          |  |  |
| Nombre de personnes exposées à un dépassement de l'objectif de qualité                       |                   |                 |                        |  |  |
| Nombre de personnes exposées à un dépassement de la valeur cible                             |                   |                 |                        |  |  |

<sup>\*</sup>Évolution des concentrations en 2022 par rapport à la moyenne des quatre dernières années

Nombre de personnes exposées à un dépassement de la valeur limite

### Qualité de l'air sur le territoire

En 2022, dans un contexte de reprise des activités humaines, la qualité de l'air en Occitanie reste meilleure qu'elle ne l'était avant la crise sanitaire.

Sur le territoire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, les concentrations de particules en suspension (PM<sub>10</sub>), de particules fines (PM<sub>2.5</sub>) et de dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>) sont proches de la moyenne régionale et sensiblement plus élevées à Tarbes qu'à Lourdes. Les niveaux de particules sont en hausse par rapport à 2021 alors que ceux de dioxyde d'azote ne présentent pas d'évolution notable. La réalisation de cartographies de dispersion des polluants atmosphériques (présentées dans ce document) a permis d'évaluer que 1250 habitants étaient concernés par des dépassements de l'objectif de qualité pour les particules fines.

Concernant l'ozone, polluant non directement émis par l'homme, l'été caniculaire a favorisé sa formation. Tous les habitants de la région sont exposés à un dépassement de l'objectif de qualité.

Quinze épisodes de pollution ont touché les Hautes-Pyrénées, au cours de l'année, dix liés aux particules en suspension et cinq à l'ozone.

### Évolution pluriannuelle - PM<sub>2.5</sub>



### Évolution pluriannuelle - 03



### Exposition ponctuelle (nombre d'épisodes de pollution)

| TOTAL            | 0    | 7    | 6    | 17   | 15   |  |
|------------------|------|------|------|------|------|--|
| PM <sub>10</sub> | 0    | 7    | 6    | 17   | 10   |  |
| 03               | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    |  |
|                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |

### Indices de qualité de l'air (distribution annuelle)



<sup>\*\*</sup>Données qui intègrent les incertitudes du modèle. Pour le NO<sub>2</sub>, données estimées entre 35 et 40 µg/m³.

### Les sources de pollution







tertiaire






PARTICULES EN SUSPENSION INFÉRIEURES À 10 MICROMÈTRES


PARTICULES FINES INFÉRIEURES À 2,5 MICROMÈTRES

OXYDES D'AZOTE


### Part des émissions



### Part des émissions



Part des émissions



### **Évolution 2019 -> 2020**



Évolution 2019 -> 2020



**Évolution 2019 -> 2020** 



### Émissions / Habitant




### Émissions / Habitant




Émissions / Habitant




### Part du territoire



Part du territoire



### Part du territoire



Source : Inventaire des émissions - Atmo Occitanie - ATMO\_IRS\_V6\_2008\_2020

\*t<sub>enCD2</sub>: tonne équivalent CO<sub>2</sub>

En 2020, la crise sanitaire et les restrictions mises en place pour y faire face ont entraîné un ralentissement global des activités humaines et une baisse inédite des émissions polluantes. Les données de l'inventaire des émissions 2020 présentées ici montrent des diminutions importantes qui sont à liées à ce contexte exceptionnel.



### 20% 16% 8% 34% 34%


### Évolution 2019 -> 2020



### Émissions / Habitant



### Part du territoire



### **Principaux leviers d'actions**

### Les transports



63% des  $N0_x$  et 36% des GES du territoire sont émis par les

transports. Les émissions de NOx et de GES totaux par ce secteur sont en forte baisse en 2020 suite aux restrictions de circulation imposées lors de la crise de la COVID-19 (trafic routier en recul de près de 18 % sur le territoire). La baisse observée des émissions de GES est exceptionnelle au regard de la tendance observée depuis plus de 10 ans et il conviendra de voir si elle se confirme avec le retour à la normale des activités humaines.

### Le résidentiel

**57%** des PM<sub>2,5</sub> et **44%** des PM<sub>10</sub> du territoire sont émis par

le résidentiel. Ce secteur est le premier émetteur de particules sur le territoire de Tarbes Lourdes Pyrénées, il s'agit également de la deuxième source de GES. Le chauffage, notamment l'usage d'anciens appareils au bois peu efficaces, est à l'origine d'une part importante des particules émises. Le renouvellement des dispositifs de chauffage et un accompagnement aux bonnes pratiques permettraient de limiter la consommation énergétique et donc de réduire les émissions polluantes.

### L'agriculture



**18%** des  $PM_{10}$  et **15%** des  $N0_x$  du territoire sont émis par

l'agriculture. La principale source de particules primaires de ce secteur est le travail du sol. Réduire le nombre de passages, ne pas travailler la terre sèche par vent fort et couvrir les sols en hiver sont des pistes pouvant aider à limiter les émissions de particules. Les oxydes d'azote proviennent de différentes sources, notamment l'apport d'engrais azoté et l'utilisation des engins. L'évolution des pratiques agricoles et la rationalisation de l'usage des engins permettraient de faire diminuer les émissions.

### Pour bien comprendre

Émissions et concentrations de polluants, ce n'est pas la même chose



Les **émissions de polluants** correspondent aux quantités de polluants produites et rejetées par les activités humaines. Elles sont exprimées le plus souvent en **kilogrammes ou tonnes par an**.




Les concentrations de polluants caractérisent la qualité de l'air que l'on respire : une fois dans l'atmosphère les polluants peuvent se disperser avec le vent, se transformer, interagir entre eux. Elles s'expriment généralement en microgrammes par mètre cube (µg/m³).

De quoi se compose un polluant ? Quel est son impact sur notre santé ou sur l'environnement ?

Consultez les réponses sur notre site internet : www.atmo-occitanie.org

### Émissions de polluants atmosphériques et objectifs PRÉPA

### Évolution des émissions de polluants atmosphériques en 2020 par rapport à 2014





Le Plan National de Réduction des Émissions de Polluants Atmosphériques (PRÉPA), adopté en 2017 et révisé en 2022, fixe des objectifs de réduction des émissions des principaux polluants à l'horizon 2030. Ces objectifs nationaux sont ici retranscrits à l'échelle du territoire.

Les évolutions des émissions sont évaluées à partir de l'année 2014 prise en référence.

### Le territoire est-il sur la bonne trajectoire en 2020 ?

Oxydes d'azote

0UI

Les émissions évaluées en 2020 pour le territoire sont **inférieures de 16 %** à celles attendues en 2020 selon la trajectoire ciblée par le PRÉPA.

Particules fines PM<sub>2.5</sub>

**OUI** 

Les émissions évaluées en 2020 pour le territoire sont **inférieures de 13 %** à celles attendues en 2020 selon la trajectoire ciblée par le PRÉPA.

Ammoniac

NON

Les émissions évaluées en 2020 pour le territoire sont **supérieures de 7** % à celles attendues en 2020 selon la trajectoire ciblée par le PRÉPA. L'agriculture et les installations de traitement de déchets (compostage, eaux usées...) sont les principales sources d'ammoniac. L'estimation de l'évolution de ces émissions et la transposition des objectifs nationaux de réduction des émissions polluantes à l'échelle locale peuvent être entachées d'incertitudes en raison de l'absence de données d'activité détaillées pour le territoire.


Dioxyde de soufre **\$0**<sub>2</sub>

OUI

Les émissions évaluées en 2020 pour le territoire sont **inférieures de 62 %** à celles attendues en 2020 selon la trajectoire ciblée par le PRÉPA. Les émissions de dioxyde de soufre sont liées à plusieurs sources, notamment industrielles. Les variations dans les quantités émises déclarées peuvent fortement impacter la tendance constatée. Les quantités de  $SO_2$  émises ne présentent pas d'enjeux particuliers sur ce territoire.

### Émissions de Gaz à effet de serre et objectifs SNBC

### Évolution des émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 1990





La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), révisée en 2020, définit des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Ces objectifs nationaux sont ici retranscrits à l'échelle du territoire. Toutes les évaluations sont réalisées conformément aux modalités SNBC (Scope 1, hors GES biomasse).

Les évolutions des émissions sont évaluées à partir de l'année 1990 prise en référence.

GES hors CO<sub>2</sub> biomasse ? GES totaux ?

Les émissions de gaz à effet de serre dit « hors  $CO_2$  biomasse » sont constituées de l'ensemble des émissions de GES (GES totaux) desquelles l'on déduit les émissions de  $CO_2$  provenant de la décomposition ou de la combustion de matières organiques. Le  $CO_2$  émis lors de la combustion de granules de bois, d'éthanol ou de biogaz par exemple n'est donc pas pris en compte pour le calcul des GES hors  $CO_2$  biomasse. Ces combustibles, entre autres, sont considérés « carboneutres ».

### Le territoire est-il sur la bonne trajectoire en 2020 ?

Hors CO<sub>2</sub> biomasse

**OUI** 

Les émissions de gaz à effet de serre évaluées en 2020 pour le territoire sont **inférieures** de 6 % à celles attendues en 2020 selon la trajectoire ciblée par la SNBC.


### Zoom sur le transport routier

Évolution des kilomètres parcourus sur le territoire


Évolution 2019 -> 2020



Contribution des différentes types de véhicules aux émissions de polluants et de gaz à effet de serre




### Zoom sur la consommation énergétique




12 % de bois et déchets assimilés; 5 % de pétrole ou de gaz de pétrole liquéfié.


## L'exposition chronique au dioxyde d'azote\*



<sup>·</sup> Données qui intègrent les incertitudes du modèle et qui recourent à des estimations sur l'activité humaine. Pour le NO<sub>2</sub>, données estimées entre 35 et 40 µg/m³.

## L'exposition chronique aux particules\*






<sup>\*</sup> Données qui intègrent les incertitudes du modèle et qui recourent à des estimations sur l'activité humaine.

# L'exposition chronique du département à l'ozone\*

Situation vis-à-vis de la protection de la santé (valeur cible, moyenne sur 3 ans)



### Les principales zones impactées

### Particules

Concernant l'exposition aux particules en suspension inférieures à 10 micromètres (carte en haut à gauche), la valeur imite et l'objectif de qualité sont respectés sur l'ensemble des zones habitées.

L'objectif de qualité pour les particules fines inférieures à 2,5 micromètres (carte en bas à gauche) est dépassé et 1250 habitants de l'agglomération sont concernés par ce dépassement.

Les deux cartes mettent en évidence de fortes concentrations de particules dans les environs d'une sablière située au nord de l'agglomération. Les dépassements de seuils sont circonscrits aux abords immédiats de l'exploitation et aucun habitant n'est exposé à un dépassement des valeurs réglementaires.

### )zone

La formation d'ozone est favorisée par l'ensoleillement et les fortes températures. L'été 2022 a présenté des conditions météorologiques caniculaires qui en ont fait l'été le plus chaud depuis 2003. Les concentrations d'ozone sont ainsi en hausse sur l'ensemble de la région et tous les habitants sont touchés par un dépassement de l'objectif de qualité. Dans les Hautes-Pyrénées, la valeur cible est toutefois respectée.



### Pour aller plus loin, en 2022

- ⇒ Évaluation de la qualité de l'air sur le territoire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à travers la réalisation de campagnes de mesure sur l'ensemble de l'agglomération.
- Accompagnement de la collectivité dans le suivi de son Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) : Rédaction d'un rapport analysant les indicateurs d'émission et les principaux enjeux concernant la qualité de l'air sur le territoire.
- Renforcement des dispositifs de suivi de Tarbes et de Lourdes avec la mise en œuvre de la surveillance de polluants spécifiques (benzo(a)pyrène, dioxines et furanes) et de polluants d'intérêt nationaux non encore réglementés (*black carbon*, carbone total, particules très fines (PM<sub>1</sub>). Les mesures sont réalisées dans le cadre de la campagne d'évaluation de la pollution aux particules réalisée en partenariat avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, l'Agence Régionale de Santé et Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Cette étude s'inscrit dans une évaluation plus large de l'impact de la combustion de biomasse dont les écobuages. Des mesures sont également réalisées à Argelès-Gazost, au cœur du Parc National des Pyrénées.

### Études réalisées :



Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées : État des lieux des émissions polluantes et analyse des secteurs à enieux, 2019

Cet état de référence actualisé avec les dernières données disponibles à l'échelle locale permet à chacun de visualiser l'évolution des émissions polluantes annuelles depuis plus de 10 ans, en lien avec les actions d'ores et déjà engagées sur le territoire.



Surveillance du benzo(a)pyrène (B[a]P) dans l'air ambiant (moyenne janvier 2022 à décembre 2022)

### **Perspectives 2023**



Renouvellement du partenariat entre Tarbes Lourdes Pyrénées et Atmo Occitanie.

- ⇒ Poursuivre l'accompagnement de Tarbes-Lourdes-Pyrénées dans le suivi de son PCAET :
  - Réaliser des cartographies en haute-résolution des principaux polluants atmosphériques ;
  - Évaluer l'impact de la prime air-bois ;
  - Mettre à jour les indicateurs d'émission et de consommation, rédiger un rapport d'analyse.
- ⇒ Sensibiliser à la qualité de l'air en milieu scolaire.

### Valeurs réglementaires et recommandations OMS

| POLLUANT  | TYPE | PÉRIODE              | VALEUR         | MODE DE CALCUL  |
|---|------|----------------------|----------------|---|
| Particules<br>en suspension<br>de diamètre<br>< 10 micromètres  |      | Année civile         | 50 µg/m³       | 35 jours de dépassement<br>autorisés par année civile   |
|   |      | Année civile         | 40 μg/m³       | Moyenne   |
|   |      | Année civile         | 30 μg/m³       | Moyenne   |
|   |      | Année civile         | 75 μg/m³       | Moyenne   |
| Particules<br>en suspension<br>de diamètre<br>< 2,5 micromètres |      | Année civile         | 25 μg/m³       | Moyenne   |
|   |      | Année civile         | 20 μg/m³       | Moyenne   |
|   |      | Année civile         | 10 µg/m³       | Moyenne   |
|   |      | Année civile         | 5 μg/m³        | Moyenne   |
| Dioxyde   |      | Année civile         | 200 μg/m³      | 18 heures de dépassement<br>autorisées par année civile   |
|   |      | Année civile         | 40 μg/m³       | Moyenne   |
| d'azote   |      | Année civile         | 30 μg/m³ (Nox) | Moyenne   |
|   |      | Année civile         | 10 µg/m³       | Moyenne   |
| Ozone   |      | 8h                   | 120 µg/m³      | Mayenne glissante <sup>[2]</sup> à ne pas dépasser plus de 25 jours par<br>année civile en moyenne calculée sur 3 ans |
|   |      | 8h                   | 120 μg/m³      | Moyenne glissante <sup>(1)</sup>  |
|   |      | 8h                   | 100 μg/m³      | Valeur maximale journalière   |
|   |      | 8h                   | 60 µg/m³       | Moyenne glissante <sup>(4)</sup>  |
|   |      | Du 01/05<br>au 31/07 | 18 000 μg/m³/h | Valeur par heure en AO40 <sup>(3)</sup><br>en moyenne calculée sur 5 ans  |
|   |      | Du 01/05<br>au 31/07 | 6 000 μg/m³/h  | Valeur par heure<br>en AO40 <sup>(3)</sup>  |
|   |      | Année civile         | 350 µg/m³      | 24 heures de dépassement autorisés  |
|   |      | Arii/ee civile       | 125 μg/m³      | Moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 jour.   |
| Dioxyde<br>de soufre  |      | Année civile         | 20 μg/m³       | · Moyenne   |
|   |      | Du 01/10<br>au 31/03 | 20 µg/m³       | Moyerne   |
|   |      | Année civile         | 50 μg/m³       | Moyenne   |
| Monoxyde<br>de carbone  |      | 8h                   | 10 mg/m³       | Maximum journalier<br>de la moyenne glissante   |
| Benzo[a]pyrène  |      | Année civile         | 1 ng/m³        | Moyenne   |
| Benzène   |      | Année civile         | 5 μg/m³        | Moyenne   |
|   |      | Année civile         | 2 μg/m³        | Moyenne   |
| Plomb -   |      | Année civile         | 0,5 μg/m³      | Moyenne   |
|   |      | Année civile         | 0,25 μg/m³     | Moyenne   |
| Arsenic   |      | Année civile         | 6 ng/m³        | Moyenne   |
| Cadmium   |      | Année civile         | 5 ng/m³        | Moyenne   |
| Nickel  |      | Année civile         | 20 ng/m³       | Moyenne   |

µg/m³ = microgramme par mètre cube, ng/m³ = nanogramme par mètre cube, mg/m³ = milligramme par mètre cube

(1) La movenne glissante est calculée toutes les heures. Les procédures d'information ou d'alerte sont mises en œuvre selon les modalités décrites par les arrêtés préfectoraux en vigueur et/ou la procédure interne de gestion des épisodes de pollution. (2) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève : la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même et la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour. (3) L'AOT40, exprimé en  $\mu g/m^3$  par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80  $\mu g/m^3$  (soit 40 ppb) et 80  $\mu g/m^3$  en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée. (4) Moyenne de la concentration maximale journalière d'ozone en movenne sur 8 heures pendant les six mois consécutifs où la concentration d'ozone en moyenne glissante sur six mois est la plus élevée.

### Valeur limite dépassée

La valeur limite est un niveau à ne pas dépasser si l'on veut réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement.

### Valeur cible dépassée

La valeur cible correspond au niveau à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée pour réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement.

### Objectif de qualité non respecté

L'objectif de qualité est un niveau à atteindre à long terme afin d'assurer une protection efficace de la santé et de l'environnement dans son ensemble.



Correspond à une recommandation de l'Organisation Mondiale de la santé

### Seuil de déclenchement des épisodes de pollution

| POLLUANT   | TYPE           | PÉRIODE   | VALEUR    | MODE DE CALCUL  |  |  |
|--|----------------|---|-----------|---|--|--|
| Particules<br>en suspension<br>de diamètre<br>< 10 micromètres |                | 24h   | 80 µg/m³  | Mayenne journalière   |  |  |
|  | 4              | 24h   | 50 μg/m³  | En cas de persistance du<br>dépassement sur 2 jours consécutifs |  |  |
|  |                | 24h   | 50 μg/m³  | Moyenne journalière   |  |  |
|  |                | 24h   | 45 μg/m³  | Moyenne journalière   |  |  |
| Particules<br>en suspension                                    |                | 24h   | 15 μg/m³  | Moyenne journalière   |  |  |
| de diamètre<br>< 2,5 micromètres                               |                | Pas d'équivalent dans la réglementation française |           |   |  |  |
| Dioxyde<br>d'azote   | <b>(</b>       | 3h<br>consécutives                                | 400 μg/m³ | Mayenne horaire   |  |  |
|  |                | Horaire   | 200 µg/m³ | En cas de persistance du<br>dépassement sur 3 jours consécutifs |  |  |
|  |                | Horaire   | 200 μg/m³ | Moyenne horaire   |  |  |
|  |                | 24h   | 25 μg/m³  | Moyenne journalière   |  |  |
| Ozone  |                | Horaire   | 180 µg/m³ | En cas de persistance du<br>dépassement sur 2 jours consécutifs |  |  |
|  |                | 3h<br>consécutives                                | 240 μg/m³ | Moyenne horaire   |  |  |
|  | 3h<br>consécut | 3h<br>consécutives                                | 300 μg/m³ | Moyenne horaire   |  |  |
|  |                | Horaire   | 360 µg/m³ | Moyenne horaire   |  |  |
|  |                | Horaire   | 180 µg/m³ | Moyenne horaire   |  |  |

 $\mu g/m^3 = microgramme \ par \ m\`etre \ cube$ 

Les procédures en cas de dépassement des seuils sont déclenchées selon les modalités décrites par les arrêtés préfectoraux en vigueur et/ou la procédure interne de gestion des dépassements des seuils d'information et d'alerte.



Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population et à partir duquel des mesures doivent immédiatement être prises.

### Seuil de recommandation et d'information

Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé des groupes de personnes particulièrement sensibles (personnes âgées, enfants en bas âge, patients souffrant d'une pathologie cardiague ou respiratoire...) et à partir duquel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires.

### Valeur guide OMS

Recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé

### exique

### Fond urbain

### **Proximité trafic**

### NO<sub>x</sub>

### $NO_2$

PM<sub>10</sub>
Particules en suspension inférieures à 10 micromètres

**SO<sub>2</sub>** Dioxyde de soufre





### ATMO OCCITANIE, VOTRE OBSERVATOIRE DE L'AIR

### Quelles sont nos valeurs?

Indépendance : notre gouvernance répartit de façon équitable les pouvoirs au sein de notre Conseil d'Administration, composé de quatre collèges : l'État, collectivités, activités émettrices, associations et personnes qualifiées.

**Transparence :** tous les rapports et études sont mis à disposition du public sur notre site internet.

Compétence, efficacité, expertise : L'Observatoire est agréé par les services de l'État : nos travaux sont expertisés et audités par le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air, le référent technique national du Ministère.

### **Abonnez-vous gratuitement sur notre site internet**

- Pour être informé de la qualité de l'air dans votre commune,
- pour être alerté en cas d'épisode de pollution,
- pour connaître les actualités d'Atmo Occitanie.

### Les missions d'Atmo Occitanie

Surveiller la qualité de l'air 24h/24 en région
Un dispositif régional d'une cinquantaine de sites de mesures combiné à des outils de simulation informatique permet de modéliser les rejets de polluants dans l'air.



### Prévoir la qualité de l'air

Au quotidien une prévision de la qualité de l'air sur toute l'Occitanie pour le jour même et le lendemain est réalisée.



### Informer au quotidien/en cas d'épisode de pollution

les citoyens, médias, autorités et collectivités en diffusant ses prévisions et les indices qualité de l'air par commune.

Accompagner les décideurs, acteurs locaux
Les évaluations menées sont mises en place au travers de
conventions pluriannuelles de partenariat avec ses adhérents afin
d'améliorer les connaissances sur la qualité de l'air localement et en
région.

### **Conditions de diffusion**

Atmo Occitanie met à disposition les informations issues de ses différentes études et garantit la transparence de l'information sur le résultat de ses travaux. A ce titre, les rapports d'études sont librement accessible sur notre site internet.

Les données contenues dans ce document restent la propriété intellectuelle d'Atmo Occitanie. Toute utilisation partielle ou totale de données ou d'un document (extrait de texte, graphique, tableaux...) doit obligatoirement faire référence à Atmo Occitanie. Les données ne sont pas rediffusées en cas de modification ultérieure. Atmo Occitanie n'est en aucune façon responsable des interprétations et travaux intellectuels, publications diverses résultant de ses travaux et pour lesquels aucun accord préalable n'aurait été donné.

### **Nous contacter**

contact@atmo-occitanie.org
09.69.36.89.53

Agence de Montpellier (siège social)

10 rue Louis Lépine - Parc de la méditerranée
34470 PÉROLS

Agence de Toulouse 10 bis chemin des Capelles 31300 TOULOUSE





